WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6 :

A61K 9/08, 9/12, 47/10, 47/40

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 96/19969

A1

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

4. Juli 1996 (04.07.96)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE95/01847

(22) Internationales Anmeldedatum:

19. December 1995

(19.12.95)

(30) Prioritätsdaten:

P 44 46 891.1

27. December 1994 (27.12.94)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): DR. FALK PHARMA GMBH [DE/DE]; Leinenweberstrasse 5, D-79108 Freiburg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): OTTERBECK, Norbert [DE/DE]; Schreibersbildstrasse 39, D-88662 Überlingen (DE). KUHN, Reimund [DE/DE]; Am Herrwald 5, D-79348 Freiamt (DE).

(74) Anwalt: LEDERER, KELLER & RIEDERER; Prinzregentenstrasse 16, D-80538 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: CA, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: STABLE BUDESONIDE SOLUTIONS, METHOD OF PREPARING THEM AND USE OF THESE SOLUTIONS AS ENEMA PREPARATIONS AND PHARMACEUTICAL FOAMS

(54) Bezeichnung: STABILE BUDESONID-LÖSUNGEN, VERFAHREN ZU DEREN HERSTELLUNG SOWIE VERWENDUNG DIESER LÖSUNGEN ALS KLISTIERZUBEREITUNGEN UND PHARMAZEUTISCHE SCHÄUME

(57) Abstract

The invention pertains to stable budesonide solutions with a pH value of 6.0 or lower, dissolved in water, alcohol or a water-alcohol mixture. Preferably these solutions also contain sodium EDTA, cyclodextrin or mixtures thereof. These stable budesonide solutions can be used to prepare an enema or rectal foams.

(57) Zusammenfassung

Die vorliegende Erfindung betrifft stabile Budesonid-Lösungen mit einem pH-Wert von 6,0 oder darunter, die in Wasser, Alkohol oder einer Wasser/Alkohol-Mischung gelöst sind. Bevorzugt enthalten diese Lösungen weiterhin Natrium-EDTA, Cyclodextrin oder Gernische davon. Die erfindungsgemäßen stabilen Budesonid-Lösungen können zur Herstellung eines Klistiers oder von Rektalschäumen verwendet werden.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AM	Armenien	GB	Vereinigtes Königreich	MX	Mexiko
AT	Osterreich	GE	Georgien	NE	Niger
ĀŪ	Australien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BB	Barbados	GR	Griechenland	NO	Norwegen
		HU	Ungarn	NZ	Neusceland
BE BF	Belgien Burkina Faso	IE.	Irland	PL	Polen
		IT	Italien	PT	Portugal
BG	Bulgarien	JP	Japan	RO	Rumanien
BJ	Benin	KE	Kenya	RU	Russische Föderation
BR	Brasilien			SD	Sudan
BY	Belarus	KG	Kirgisistan	SE	Schweden
CA	Kanada	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SG	Singapur
CF	Zentrale Afrikanische Republik	KR	Republik Korea	SI	Slowenien
CG	Kongo	ΚZ	Kasachstan		Slowakei
CH	Schweiz	LI	Liechtenstein	SK	
CI	Côte d'Ivoire	LK	Sri Lanka	SN	Senegal
СМ	Kamerun	LR	Liberia	SZ	Swasiland
CN	China	LK	Litauen	TD	Tschad
cs	Tschechoslowskei	LU	Luxemburg	ΤG	Togo
cz	Tschechische Republik	LV	Lettland	TJ	Tadschikistan
DE	Deutschland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dinemark	MD	Republik Moldau	UA	Ukraine
	Estland	MG	Madagaskar	UG	Uganda
EE		ML	Mali	US	Vereinigte Staaten von Amerika
ES	Spanien	MN	Mongolei	UZ	Usbekistan
FI	Finnland	MR	Mauretanien	VN	Vietnam
FR	Frankreich		******	•••	
GA	Gabon	MW	Malawi		

Stabile Budesonid-Lösungen, Verfahren zu deren Herstellung sowie Verwendung dieser Lösungen als Klistierzubereitungen und pharmazeutische Schäume

Die vorliegende Erfindung betrifft stabile Budesonid-Lösungen, Verfahren zu deren Herstellung sowie deren Verwendung zur Herstellung von Arzneimittelzubereitungen, insbesondere von Klistieren und pharmazeutischen Schäumen.

16a,17-Butylidendioxy-18,21-dihydroxy-1,4-Budesonid Wirkstoff der ein bekannter pregnadien-3,20-dion) ist Behandlung von zur allem Cortikoidreihe, vor entzündlichen bei Bronchialerkrankungen, auch aber Darmerkrankungen, wie Morbus Crohn und insbesondere Colitis genannten Bei der zuletzt eingesetzt wird. ulcerosa, rektalen Verabreichung von sich die hat Indikation Arzneiformen, wie Klistierzubereitungen oder pharmazeutischen besonders Druckgaspackungen als Schäumen in erwiesen, da der Wirkstoff direkt am Ort der Erkrankung zum Einsatz gebracht wird und Budesonid vor allem topisch wirksam ist.

Budesonid stellt ein Razemat dar, bestehend aus einer Mischung der beiden Diastereomere 22R und 22S. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung kann das Razemat eingesetzt werden, bevorzugt wird jedoch das 22R-Diastereomer eingesetzt, da

- 2 -

dieses etwa um den Faktor 2-3 in pharmakologischer Hinsicht aktiver ist. Verfahren zur Auftrennung der Enantiomere sind bekannt, beispielsweise aus der EPA 92.901023.9.

Aufgrund seiner Lipophilie ist Budesonid in Wasser praktisch in Alkoholen. Durch die jedoch gut löslich unlöslich, organische wie Lösungsvermittlern von Verwendung ausreichende eine kann wasserlösliche Alkohole Die so erhaltenen Wirkstoff in Lösung gebracht werden. jedoch für die pharmazeutische Lösungen erweisen sich Verwendung als zu wenig stabil, da innerhalb kurzer Zeit große Mengen des Wirkstoffes zersetzt sind.

Aufgrund dieser Instabilität sind Budesonid-Zubereitungen, die vom Patienten in der gebrauchsfertigen Darreichungsform direkt angewendet werden können, nicht bekannt. Zwar werden derzeit in einigen Ländern budesonidhaltige Klistiere angeboten, in diesen Fällen handelt es sich jedoch nicht um gebrauchsfertige Klistiere, sondern um eine Art Kombination aus wirkstoffhaltigen Tabletten und mit Wasser gefüllten Klistierflaschen. Vor Verabreichung muß der Patient jeweils eine Tablette entnehmen, sie in die geöffnete Klistierflasche einbringen, warten, bis die Tablette zerfallen ist und die Flaschen vor Gebrauch kräftig schütteln, um eine möglichst homogene Verteilung des Wirkstoffs in Form einer Suspension zu erreichen.

Zubereitung des umständliche und mühsame Diese insbesondere von kann Klistiers gebrauchsfertigen gebrechlichen Patienten nur unzureichend bewältigt werden. Eine homogene Verteilung des Wirkstoffs kann mit diesem und erzielt werden unzureichend nur vollständige Verabreichung des Wirkstoffs durch Ausdrücken der Klistierflasche kann kaum garantiert werden, einmal zubereitete Endform in kurzer Zeit zur Absetzung des suspendierten Wirkstoffes am Boden der Flasche neigt.

- 3 -

Die rektale Verabreichung von Budesonid mittels Rektalschäumen hat zwar im Hinblick auf die Bequemlichkeit der Anwendung Vorteile, jedoch besteht hier das Problem, Budesonid-Lösungen zur Verfügung zu stellen, die ausreichend stabil sind, um in Druckgaspackungen appliziert zu werden. Daher sind budesonidhaltige Rektalschäume bisher nicht bekannt.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ausreichend stabile Lösungen von Budesonid bereitzustellen.

Gelöst wird diese Aufgabe durch Budesonid-Lösungen, die einen pH-Wert von 6 oder darunter aufweisen.

Es wurde völlig überraschend gefunden, daß die Stabilität von budesonidhaltigen Lösungen entscheidend vom pH-Wert abhängig ist. Die Stabilität der Lösungen steigt mit abnehmendem pH-Wert an. Die erfindungsgemäßen Budesonid-Lösungen können auf wäßriger und/oder alkoholischer Grundlage hergestellt werden, wobei es auch möglich ist, Budesonid in einer wäßrigen, alkoholischen Mischung zu lösen.

wurde völlig vorliegenden Erfindung Rahmen der Ιm einen pH-Wert daß der herausgefunden, überraschend entscheidenden Einfluß auf die Stabilität der Budesonid-Lösung hat, und zwar in wäßriger, wäßrig-alkoholischer oder alkoholischer Lösung.

Die nachfolgend wiedergegebene Tabelle 1 belegt die Stabilität einer wäßrigen Lösung von Budesonid und die Tabelle 2 zeigt die Stabilität einer alkoholischen Lösung (Propylenglycol) von Budesonid in Abhängigkeit von der Lagerzeit und dem pH-Wert.

Tabelle 1

Stabilität von erfindungsgemäßen Budesonid-Lösungen (2 mg/60 ml H₂O) in Abhängigkeit von der Lagerzeit

рн	Gehalt ¹⁾ 20°C	nach 14	Tagen Lagerung bei 40°C
7,0	96,5	ક	71,2 %
6,5	96,4	*	77,1 %
6,0	97,6	ક	84,8 %
5,5	97,4	*	87,6 %
5,0	97,6	名	90,0 %
4,5	97,3	ક	93,0 %
4,0	98,7	ક	95,2 %
3,5	99,8	ક	96,6 %
3,0	100,0	ક	97,9 %

¹⁾ Ausgangswert nach t = 0 Tagen gleich 100 %

Aus der vorstehenden Tabelle 1 geht hervor, daß die Stabilität der Lösungen mit abnehmendem pH-Wert steigt. Selbst nach 14tägiger Lagerung bei 20°C und pH 3,0 ist der Wirkstoff noch zu 100 % vorhanden. Auch bei einer Lagerung bei einer deutlich erhöhten Temperatur, d.h. bei 40°C und pH 3,0, befinden sich nach 14 Tagen noch 97,9 % Budesonid in der Lösung.

- 5 -

Tabelle 2

Stabilität von erfindungsgemäßen Budesonid-Lösungen (2 mg/4 g in Propylenglycol) in Abhängigkeit von der Lagerzeit

Gehalt nach Lagerung bei					
рН	0 Monate	3 Monate 25°C	3 Monate 40°C	6 Monate	
7,5	100,0 %	80,6 %	44,4 %	15,3 %	
5,0	100,0 %	103,0 %	96,5 %	89,5 %	
2,8	100,0 %	99,4 %	98,7 %	95,2 %	

Aus der vorstehenden Tabelle 2 geht hervor, daß die Stabilität der Lösungen mit abnehmendem pH-Wert ansteigt.

Ab pH-Werten von 4,0 und tiefer werden ausreichend niedrige Wirkstoffverluste erhalten, die in Abhängigkeit von der Lagerzeit in einer für pharmazeutische Produkte akzeptablen Größenordnung liegen.

Für die pharmazeutische Verwendung sind bei der Anwendung als Klistier- oder auch als Rektalschaum aufgrund physiologischer Gegebenheiten und unter Berücksichtigung der zu verabreichenden Menge von ca. 30 bis 100 ml für Klistiere bzw. von etwa 4 g bei Rektalschäumen pH-Werte der gebrauchsfertigen Form von \geq 3,5 zu bevorzugen.

Für die Einstellung des pH-Wertes können beliebige pharmazeutisch annehmbare organische und anorganische Säuren verwendet werden, beispielsweise Salzsäure, Phosphorsäure, Zitronensäure oder Weinsäure.

Um die Stabilität weiter zu erhöhen, z.B. zur Einsparung von Transport- und Lagerkosten oder auch bei Verwendung als nicht rektale Applikationsform, können auch konzentrierte Budesonid-Lösungen mit einem pH-Wert von ≤ 3,5 hergestellt

- 6 -

werden. Falls für die spätere Verwendung eine Einstellung des pH-Wertes auf einen physiologisch verträglichen Wert von > 3,5 notwendig ist, so kann dies erst kurz vor der Anwendung erfolgen. Dies kann z.B. durch Verdünnen oder durch Zugabe einer Base geschehen. Durch den Verdünnungsvorgang erhöht sich dann der pH-Wert.

In weiteren bevorzugten Ausführungsformen weisen die erfindungsgemäßen Budesonid-Lösungen einen Zusatz von Natrium-EDTA (Natrium-Ethylendiamintetraessigsäure; Komplexon) auf, was zu einer weiteren Erhöhung der Stabilität führt.

In einer anderen bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann die Stabilität der Lösung durch die Verwendung von Cyclodextrinen, vorzugsweise von Hydroxypropyl- β -cyclodextrin oder γ -Cyclodextrin erhöht werden. Der Zusatz von Cyclodextrinen ermöglicht auch die Verwendung von konzentrierteren Lösungen von Budesonid.

Gegenstand der Erfindung sind daher stabile Budesonid-Lösungen mit einem pH-Wert von 6,0 oder darunter. Das Budesonid wird erfindungsgemäß in Wasser, Alkohol oder einer Wasser/Alkohol-Mischung gelöst.

Im Rahmen der vorliegenden Erfindung werden als Alkohole bevorzugt Propylenglycol, Ethanol oder Isopropanol verwendet.

Wenn eine Alkohol/Wasser-Mischung eingesetzt wird, liegt das Verhältnis Alkohol zu Wasser zwischen 100:0 und 80:20, bevorzugt zwischen 98:2 und 93:7.

Der Gehalt an Budesonid in der gebrauchsfertigen Lösung liegt zwischen 0,001 und 1 Gew.-%, bevorzugt zwischen 0,01 und 0,1 Gew.-% und bei Klistieren besonders bevorzugt bei 0,001 bis 0,1 Gew.-%.

- 7 -

Die erfindungsgemäßen Lösungen können ferner Hilfsstoffe den entsprechenden enthalten, wie sie üblicherweise bei pharmazeutischen Formulierungen verwendet werden. Hilfsstoffe können zur Lösungsvermittlung von Cortikoiden geeignet sein. Derartige Hilfsstoffe sind dem Fachmann geläufig.

Übliche Hilfsstoffe sind solche, die die Viskosität der erhöhen. üblicherweise beeinflussen, Lösung Chlorbutanol, Ethanol, Konservierungsmittel wie Benzoesäure, Sorbinsäure, Benzylalkohol, Phenylethanol, Natriumdisulfit, p-Hydroxybenzoesäureester, Phenol, m-Kresol, p-Chlor-m-Kresol, Quats, Chlorhexidin, Verdickungsmittel wie Cellulosederivate Pektin, Tragant, Gelatine, Hydroxypropyl-Methylcellulose, Methylcellulose, Polyvinylpyrrolidon, Carboxymethylcellulose-Natrium), Polyvinylalkohol, Polyacrylsäuren, Xanthangummi, Säuren wie Weinsäure, Salzsäure, Zitronensäure, Essigsäure, Phosphorsäure; Basen wie Kaliumhydroxid, Natriumhydoxid; Phthalatpuffer, Salzsäurepuffer, wie Puffersubstanzen Phosphatpuffer, Boratpuffer, Acetatpuffer oder Citratpuffer. Um die Löslichkeit des Wirkstoffes zu erhöhen, eignen sich z.B. der Zusatz von ausreichenden Mengen von Alkoholen wie Propylenglycol, Glycerin, Isopropanol, Ethanol, Polyethylenglycole oder der Einsatz von Lösungsvermittlern B-Cyclodextrin, vorzugsweise Cyclodextrinen, Hydroxypropyl-ß-Cyclodextrin und/oder Y-Cyclodextrin.

Budesonid-Lösungen für erfindungsgemäßen Wenn Rektalschäume verwendet werden sollen, müssen solche üblichen Hilfsstoffe zugegeben werden, die die zu bildende Dispersion erst ermöglichen. Bei derartigen Hilfsstoffen handelt es sich Fachmann bekannte Emulgatoren wie Emulgine und um dem können Weiterhin Lanettetypen. verschiedene Sorbinsäure, wie Konservierungsmittel

- 8 -

Parahydroxybenzoesäureester, Benzoesäure, Säuren wie Essigsäure, Zitronensäure, Weinsäure, Salzsäure und Phosphorsäure zugegeben werden.

Bei Rektalschäumen werden in die Druckpackungen auch die geeigneten Treibgase gegeben. Auch wenn Chlorfluorkohlenwasserstoffgase als Treibgase geeignet wären, sieht man derzeit von der Verwendung dieser Gase aus Umweltschutzgründen eher ab. Bevorzugt werden daher Kohlenwasserstoffe wie Isobutan, n-Butan oder Gemische aus Propan/n-Butan als Treibgase verwendet.

Der pH-Wert der erfindungsgemäßen Budesonid-Lösungen liegt bei 6,0 oder darunter. Bevorzugt ist ein Bereich zwischen 5,0 und 3,5 und der pH-Bereich zwischen 4,5 und 4,0 ist besonders bevorzugt.

In den erfindungsgemäßen Lösungen ist Budesonid in einer Menge zwischen 0,001 bis 1 Gew.-% vorhanden, wobei die Konzentration bei Lösungen, die als Klistiere verwendet werden sollen, niedriger ist als bei Lösungen, die für Rektalschäume vorgesehen sind. Bei Lösungen für Klistiere beträgt die bevorzugte Konzentration zwischen 0,01 und 0,1 Gew.-% und bei Rektalschäumen liegt der bevorzugte Bereich zwischen 0,01 und 0,1 Gew.-%.

Die Zugabe von Natrium-EDTA erfolgt bevorzugt in einer Menge von 0,01 bis 1,0 Gew.-%, wobei bei Klistieren ein Bereich von 0,01 bis 0,1 Gew.-% und bei Rektalschäumen eine Konzentration von 0,05 bis 1 Gew.-% bevorzugt ist.

Sofern Cyclodextrine als Lösungsvermittler zugegeben werden, erfolgt dies bevorzugt in einer Menge zwischen 0,05 und 0,5 Gew.-%, wobei eine Zugabe von etwa 0,1 Gew.-% bevorzugt ist.

Die Herstellung von Lösungen für Klistiere erfolgt nach an sich bekannten Verfahren. Es kann beispielsweise eine ethanolische Stammlösung von Budesonid einer wäßrigen Lösung der weiteren Bestandteile unter Homogenisierung eingearbeitet werden. Die Verwendung eines Oxidationsschutzmittels bzw. der Ausschluß von Sauerstoff sowie Maßnahmen im Bereich des Lichtschutzes sind nicht speziell erforderlich, sie können jedoch die Qualität und auch die Stabilität der erhaltenen Produkte verbessern. Für die rektale Anwendung wird dann die fertige Lösung in eine übliche flexible Klistierflasche mit Applikationsspitze abgefüllt, die beide bevorzugt aus opakem Kunststoff hergestellt sind.

Auch die Herstellung von Lösungen für Rektalschäume ist aus dem Stand der Technik bekannt. Beispielsweise kann das Konservierungsmittel sowie die zur Schaumbildung benötigten Emulgatoren in der entsprechenden Lösung, bevorzugt dem geeigneten Alkohol gelöst werden. Danach wird der Wirkstoff als alkoholische Stammlösung in diese Lösung eingearbeitet. Im letzten Schritt werden Komplexon und die entsprechende Säure, gelöst in einer kleinen Menge Wasser, unter Homogenisieren in die alkoholische Lösung eingerührt.

Wenn die erfindungsgemäße Budesonid-Lösung zur Herstellung eines Rektalschaumes verwendet wird, wird die fertige Lösung mit kommerziell Druckgaspackungen, die geeignete erhältlichen Ventilsystemen als Einmal- oder Mehrfachdosierer versehen sind, abgefüllt und mit einem Treibgas versetzt. Die Packungen enthalten zusätzlich eine Applikatorspitze aus chemischen und physikalischen der Aufgrund Kunststoff. Eigenschaften der erfindungsgemäßen stabilen Budesonid-Lösung wird bei der Applikation zwangsläufig der Schaum im Rektum erzeugt.

In bevorzugter Ausführungsform werden die erfindungsgemäßen stabilen Budesonid-Lösungen zur Herstellung von Klistieren oder Rektalschäumen verwendet. Andere Verwendungsformen wie

- 10 -

beispielsweise Verwendung als Dosieraerosol, Inhalationsspray oder auch als Tropfen, Sirup oder Elixiere sind ebenfalls möglich und können von dem Fachmann auf der Basis der vorliegenden Beschreibung leicht hergestellt werden. Die Erfindung wird anhand der folgenden Beispiele näher erläutert.

Beispiel 1

Nach dem vorstehend beschriebenen Verfahren wird eine Lösung hergestellt und in entsprechende Kunststoffflaschen abgefüllt, die pro 60 g Klistierflasche folgende Bestandteile enthält:

Budesonid	2	mg
ß-Cyclodextrin, Hydroxypropyl-ß-		
cyclodextrin (0,9) bzw.		
Y-Cyclodextrin	60	mg
Natrium-EDTA	30	mg
Natriumbenzoat	300	mg
Xanthangummi	360	mg
2N HCl ad pH 4,0		
Ethanol	400	mg
Wasser ad	60,00	mg

Die so hergestellte Lösung erwies sich selbst nach mehrwöchiger Lagerung bei 40°C als stabil.

- 11 -

Beispiel 2

Klysma, hergestellt nach üblichem Verfahren, enthaltend

Budesonid	2	mg
Natriumbenzoat	300	mg
Natrium-EDTA	30	mg
Propylenglycol	500	mg
Xanthangummi	360	mg
2N Salzsäure ad pH 3,5	60,00	mg

Das so hergestellte Klysma erwies sich nach mehrwöchiger Lagerung bei 40°C als stabil.

Beispiel 3

Gemäß Beispiel 1 wird eine wäßrige Lösung hergestellt, die die folgenden Bestandteile enthält:

Budesonid	2	mg
B-Cyclodextrin, Hydroxypropyl-B-		
cyclodextrin (0,9) bzw.		
Y-Cyclodextrin	60	mg
Natriumbenzoat	300	mg
Xanthangummi	360	mg
2N HCl ad pH 4,0		
Ethanol	400	mg
Wasser ad	60,00	mg

Die so hergestellte Lösung erwies sich selbst nach mehrwöchiger Lagerung bei Raumtemperatur als stabil.

- 12 -

Beispiel 4

Gemäß Beispiel 1 wird eine wäßrige Lösung hergestellt, die die folgenden Bestandteile enthält:

Budesonid	2	mg
Natrium-EDTA	30	mg
Natriumbenzoat	300	mg
Xanthangummi	360	mg
2N HCl ad pH 4,0		
Ethanol	400	mg
Wasser ad	60,00	mg

Die so hergestellte Lösung erwies sich selbst nach mehrwöchiger Lagerung bei Raumtemperatur als stabil.

Beispiel 5

Gemäß Beispiel 1 wird eine wäßrige Lösung hergestellt, die die folgenden Bestandteile enthält:

Budesonid	2	mg
Natriumbenzoat	300	mg
Xanthangummi	360	mg
2N HCl ad pH 4,0		
Ethanol	400	mg
Wasser ad	60,00	mg

Die so hergestellte Lösung erwies sich selbst nach mehrwöchiger Lagerung bei Raumtemperatur als stabil.

Beispiel 6

Untersuchung zur Stabilität der erfindungsgemäßen Lösungen

Es wurden gemäß Beispiel 1 die Formulierungen der folgenden Tabelle 3 hergestellt und auf ihre Stabilität nach 1- bis 39wöchiger Lagerung untersucht. Es wurden die folgenden Ergebnisse erhalten.

Tabelle 3

			Geha	lt ¹		
Belastungs	zeit in	Woc	hen bei	40°C		
	1	4	6	11	16	39
pH 5, ohne Zusätze	96,1%	67,6%	60,2%	56,6%		
pH 4, mit EDTA, mit γ- Cyclodextrin			100,0%	99,6%	99,8%	97,3%
pH 4, mit EDTA, mit Hydroxypropyl- ß-cyclodextrin (molarer Sub- stitutionsgrad 0,9)			100,0%	94,7%	95,0%	89,4%
pH 4, mit EDTA, mit Pro- pylenglycol			98,8 %		93,1 %	

¹ Ausgangswert t = 0 Wochen = 100 %

Die vorstehenden Versuchsergebnisse belegen, daß die erfindungsgemäßen wäßrigen Budesonid-Lösungen mit einem pH-Wert unter 6 auch nach mehrwöchiger Lagerung immer noch stabil sind. Besonders stabil sind Lösungen, die EDTA und ein Cyclodextrin enthalten. So liegen in diesen Lösungen selbst nach sechswöchiger Lagerung bei 40°C und bei einem pH von 4 immer noch 100 % Wirkstoff vor.

- 14 -

Beispiel 7

Nach dem vorstehend beschriebenen Verfahren wird eine Lösung hergestellt und in entsprechende Druckgaspackungen (z.B. Aluminiummonoblockdose, 55 ml, mit Flüssigkeitsventil, Shield und Dosierkopf) unter Zusatz eines Treibgases (Druck > 1,5 bar, wie z.B. Isobutan, n-Butan, Gemische aus Propan/n-Butan) abgefüllt.

Die Lösung enthält pro 35 g folgende Bestandteile:

Budesonid	0,01820	g
Lanette 0	0,45500	g
Eumulgin B1	0,09100	g
Eumulgin B2	0,09100	g
Sorbinsäure	0,00845	g
Komplexon	0,03000	g
Citronensäure ad pH 3,5	0,01000	g
Aqua purificata	0,90000	g
Propylenglykol ad	35,0000	g

Die so hergestellte Lösung erwies sich nach mehrmonatiger Lagerung bei 40°C als stabil.

Beispiel 8

Budesonid	0,01820	g
Lanette O	0,45500	g
Eumulgin B1	0,09100	g
Eumulgin B2	0,09100	g
Benzoesäure	0,06000	g
Citronensäure ad pH 4,0	q.s.	
Aqua purificata	0.90000	g
Propylenglykol ad	35.0000	g

Die so hergestellte Lösung erwies sich nach mehrmonatiger Lagerung bei 40°C als stabil.

- 15 -

Beispiel 9

Budesonid	0,01820 g
Lanette 0	0,45500 g
Eumulgin B1	0,09100 g
Eumulgin B2	0,09100 g
Komplexon	0,03000 g
Weinsäure ad pH 4,5	q.s.
Aqua purificata	0,90000 g
Propylenglykol ad	35.0000 g

Die so hergestellte Lösung erwies sich nach mehrmonatiger Lagerung bei 40°C als stabil.

Beispiel 10

Untersuchungen zur Stabilität der erfindungsgemäßen Lösungen

Es wurden Formulierungen gemäß Beispiel 7 mit unterschiedlichen pH-Werten hergestellt und auf ihre Stabilität nach 0 - 6-monatiger Lagerung untersucht. Folgende Ergebnisse wurden erhalten:

Gehalt nach Lagerung bei

Нф	0 Monate	3 Monate 25°C	3 Monate 40°C	6 Monate 40°C
7,5 ohne Zusätze	100,0 %	90,4 %	75,0 %	nicht best.
7,5 mit Komplexon	100,0 %	103,0 %	96,5 %	89,5 %
4,5 (94073) mit Kom- plexon, mit Zitro- nensäure	100,0 %	102,5 %	97,8 %	94,6 % (9 Monate)
4,0 (95030) mit Kom- plexon, mit Zitro- nensäure	100,0 %	.97,6 %	98,0 %	
3,5 (95035) mit Kom- plexon, mit Zitro- nensäure	100,0 %	100,8 %	100,2 %	

Tabelle 4

Die vorstehenden Versuchsergebnises belegen, daß die erfindungsgemäßen alkoholischen Budesonid-Lösungen mit einem pH-Wert unter 6 auch nach mehrmonatiger Lagerung noch stabil sind. Besonders stabil sind Lösungen, die zusätzlich noch Komplexon enthalten. Selbst nach 6-9 Monaten bei 40°C-Lagerung sind die aufgetretenen Wirkstoffverluste äußerst gering.

Patentansprüche

- 1. Stabile Budesonid-Lösung mit einem pH-Wert von 6 oder darunter.
- Stabile Budesonid-Lösung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Budesonid gelöst ist in Wasser, Alkohol oder einer Wasser/Alkohol-Mischung.
- 3. Stabile Budesonid-Lösung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei dem Alkohol um Ethanol, Isopropanol oder Propylenglycol handelt.
- 4. Stabile Budesonid-Lösung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie zusätzlich Natrium-EDTA, Cyclodextrin oder Gemische davon enthält.
- 5. Stabile Budesonid-Lösung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie 0,001 bis 0,1 Gew.-% Budesonid enthält.
- 6. Stabile Budesonid-Lösung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie 0,01 bis 1 Gew.-% Natrium-EDTA und/oder 0,05 bis 1,0 Gew.-% Cyclodextrine enthält.
- 7. Stabile Budesonid-Lösung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie einen pH-Wert von unter 6 besitzt, 0,001 bis 0,1 Gew.-% Budesonid, 0,001 bis 0,1 Gew.-% Natrium-EDTA und/oder 0,05 bis 1,0 Gew.-% Cyclodextrine enthält.

PCT/DE95/01847

- 8. Verfahren zur Herstellung von stabilen budesonidhaltigen Lösungen nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der pH-Wert der Budesonid-Lösung auf einen Wert von 6,0 oder darunter eingestellt wird.
- 9. Klistier, dadurch gekennzeichnet, daß es eine stabile Budesonid-Lösung nach einem der Ansprüche 1 bis 7 umfaßt.
- 10. Rektalschaum, dadurch gekennzeichnet, daß dieser eine stabile wäßrige Budesonid-Lösung nach einem der Ansprüche 1 bis 7 umfaßt.
- 11. Verwendung einer stabilen Budesonid-Lösung nach einem der Ansprüche 1 bis 7 zur Herstellung eines Klistiers.
- 12. Verwendung einer stabilen Budesonid-Lösung nach einem der Ansprüche 1 bis 7 zur Herstellung eines Rektalschaumes.

PCT/DE 95/01847 A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 6 A61K9/08 A61K9/12 A61K47/10 A61K47/40 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 6 A61K Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Relevant to claim No. Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Category ' 1,2,8 X ATEMWEGS- UND LUNGENKRANKHEITEN, vol. 20, no. 7, 1994, pages 381-382, XP000568623 J.DERBACHER ET AL.: "Physikalische Eigenschaften von Inhalationslösungen" see page 382, left-hand column, paragraph WO,A,95 14474 (DR. FALK PHARMA GMBH) 1 1-3,5,P,X June 1995 8-12 see page 4 - page 5; example 4 EP,A,O 468 555 (GIULIANI SPA) 29 January 1-12 Α 1992 see example 6 -/--X Further documents are listed in the continuation of box C. X Patent family members are listed in annex. Special categories of cited documents: "I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance invention 'E' earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to filing date involve an inventive step when the document is taken alone document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-ments, such combination being obvious to a person shilled *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "&" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report Date of the actual completion of the international search 29.05.96

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

10 May 1996 Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Ripswijk Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+ 31-70) 340-3016

2

Authorized officer

Tzschoppe, D

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International ication No
PCT/DE 95/01847

(Continu	tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
ategory *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P.A	J.PHARM.SCI., vol. 84, no. 6, 1995, pages 677-681, XP000567853 H.NOLEN ET AL.: "Budesonide - beta-D-glucuronide: A potential Prodrug for Treatment of Ulcerative Colitis" see abstract	1-12
١	WO,A,94 16710 (JANSSEN PHARMACEUTICA NV) 4 August 1994 see page 1, line 18 - page 3, line 7	1-12
\	US,A,4 383 992 (JOHN M. LIPARI) 17 May 1983 see column 3, line 48 - column 6, line 6	1-12

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International . ication No
PCT/DE 95/01847

Patent document cited in search report	Publication date	Patent memb		Publication date	
WO-A-9514474	01-06-95	DE-A- 4340057		01-06-95	
EP-A-468555	29-01-92	IT-B- CA-A- JP-A- US-A-	1243379 2044676 4234315 5449520	10-06-94 28-01-92 24-08-92 12-09-95	
WO-A-9416710	04-08-94	AU-B- CA-A- EP-A- FI-A-	5883394 2153681 0680328 953505	15-08-94 04-08-94 08-11-95 20-07-95	
US-A-4383992	17-05-83	NONE .			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales nzeichen PCT/DE 95/01847

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 6 A61K9/08 A61K9/12 A61K47/10 A61K47/40 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 6 A61K Recherchierte aber nicht zum Mindestprüßsoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evil. verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. Kategorie* 1.2.8 ATEMWEGS- UND LUNGENKRANKHEITEN. Bd. 20, Nr. 7, 1994, Seiten 381-382, XP000568623 J.DERBACHER ET AL.: "Physikalische Eigenschaften von Inhalationslösungen" siehe Seite 382, linke Spalte, Absatz 1 1-3,5,WO,A,95 14474 (DR. FALK PHARMA GMBH) P,X 8-12 1.Juni 1995 siehe Seite 4 - Seite 5; Beispiel 4 1-12 EP,A,O 468 555 (GIULIANI SPA) 29. Januar A 1992 siehe Beispiel 6 -/--X Siehe Anhang Patentfamilie X Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entachmen "T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugnundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie Veröffendichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit berühend betrachtet werden, wenn die Veröffendichung mit einer oder mehreren anderen Veröffendichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist ausgeführt) *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist dem Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedabum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der internationalen Recherche **29**. 05.98 10.Mai 1996 Bevollmächtigter Bediensteter Name und Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL · 2280 HV Rijswijk Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax (+ 31-70) 340-3016 Tzschoppe, D

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationale tenzeichen
PCT/DE 95/01847

	mg) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	T/DE 95/0184/
Lategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, sowat erforderlich unter Angabe der in Betracht kommende	n Tale Betr. Anspruch Nr.
P,A	J.PHARM.SCI., Bd. 84, Nr. 6, 1995, Seiten 677-681, XP000567853 H.NOLEN ET AL.: "Budesonide - beta-D-glucuronide: A potential Prodrug for Treatment of Ulcerative Colitis" siehe Zusammenfassung	1-12
4	WO,A,94 16710 (JANSSEN PHARMACEUTICA NV) 4.August 1994 siehe Seite 1, Zeile 18 - Seite 3, Zeile 7	1-12
A	US,A,4 383 992 (JOHN M. LIPARI) 17.Mai 1983 siehe Spalte 3, Zeile 48 - Spalte 6, Zeile 6	1-12

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationale. :enzeichen
PCT/DE 95/01847

Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO-A-9514474		DE-A- 4340057		
EP-A-468555	29-01-92	IT-B- CA-A- JP-A- US-A-	1243379 2044676 4234315 5449520	10-06-94 28-01-92 24-08-92 12-09-95
WO-A-9416710	04-08-94	AU-B- CA-A- EP-A- FI-A-	5883394 2153681 0680328 953505	15-08-94 04-08-94 08-11-95 20-07-95
US-A-4383992	17-05-83	KEINE		